

関西電力病院 TS-1 用 トレーシングレポート

調剤薬局→薬剤部 FAX 06-7501-1404

調剤薬局記入欄

患者 ID	保険薬局名
患者名	電話
処方せん発行日	FAX
調剤日	保険薬剤師

処方薬剤の服薬状況（コンプライアンス）に関する情報

TS-1 投与に際し、注意する薬剤（一般名）服用の有無

フェニトイン ワーファリン アンコチル（フルシトシン）（併用禁忌）

副作用（TS-1 副作用チェックのフローチャート参照）

* TS-1 を服用されている全ての方対象

1日4回以上の下痢（ 回/日）

かゆみを伴う発疹

38℃以上の発熱

食事、飲水

* ワーファリン服用時

皮下出血(歯ぐきからの出血、青あざ等)

* フェニトイン併用時

眠気 失調 ふらつき

不随意運動

その他特記事項

関西電力病院薬剤部記入欄

ワーファリン併用時：PT-INR

記入者

フェニトイン併用時：PHT

記入者

主治医の先生方へ

***相互作用あり TS-1 とワーファリン・フェニトイン併用時
PT-INR、PHT 血中濃度測定して下さい。**

調剤薬局→ 関西電力病院 薬剤部→ カルテ添付